

Fitofotodermatose

**Nome Popular:
Queimadura com Limão**

Causa

- Descascar 4 limões
- Lavar rapidamente as mãos apenas com água
- Tomar banho de mar
- Ficar exposto ao sol durante o dia

Consequência

- **Apresentação de quadro agudo de Fitofotodermatose na mão e antebraço direito**

2 dias após exposição ao sol



- Inchaço, aparecimento de bolhas e muita dor
- Perda parcial dos movimentos dos dedos
 - Quadriderme Creme por 3 dias em intervalos de 6 horas;

3 dias após exposição ao sol



- **Aumento de Inchaço, aparecimento de bolhas;**
- **Perda dos movimentos dos dedos e braço;**
 - **Quadriderme Creme por mais 2 dias em intervalos de 6 horas;**
 - **Antibiótico Amoxicilina 500 mg em intervalos de 8 horas para evitar infecção devido as bolhas;**

4 dias após exposição ao sol



- Inchaço e bolhas em estado avançado;
- Perda total dos movimentos dos dedos;
- Dor aguda na região queimada;
 - Advantan creme por 5 dias em intervalos de 12 horas;
 - Antibiótico Amoxicilina 500 mg em intervalos de 8 horas para evitar infecção devido as bolhas;
 - Injeção 1 ampola de Dipevapax para conter inchaço, bolhas e dor;

7 dias após exposição ao sol



- **Regressão do Inchaço e das bolhas;**
- **Retorno dos movimentos dos dedos;**
- **Diminuição da dor na região queimada;**
 - Advantan creme em intervalos de 12 horas;
 - Antibiótico Amoxicilina 500 mg em intervalos de 8 horas para evitar infecção devido as bolhas;

9 dias após exposição ao sol



- Término do Inchaço e das bolhas;
- Retorno total dos movimentos dos dedos;
 - Advantan creme em intervalos de 12 horas;
 - Antibiótico Amoxicilina 500 mg em intervalos de 8 horas para evitar infecção devido as bolhas;

11 dias após exposição ao sol



- Secagem total das bolhas
- Troca de pele
 - Advantan creme por mais 2 dias em intervalos de 12 horas;
 - Antibiótico Amoxicilina 500 mg em intervalos de 8 horas até o término das cápsulas;

13 dias após exposição ao sol



- Secagem total das bolhas
- Troca de pele
 - Advantan creme por mais 1 dia em intervalos de 12 horas;
 - Antibiótico Amoxicilina 500 mg em intervalos de 8 horas até o término das cápsulas;

16 dias após exposição ao sol



- **Pele avermelhada e muito sensível;**
 - **Solaquin creme na região escura (contorno da queimadura) uma vez ao dia antes de dormir;**
 - **Protetor solar Sunmax fator 60 duas vezes ao dia;**

30 dias após exposição ao sol



- Diminuição da região escura no contorno da queimadura;
- Pele avermelhada e diminuição da sensibilidade,
 - Solaquin creme na região escura (contorno da queimadura) uma vez ao dia antes de dormir;
 - Protetor solar Sunmax fator 60 durante exposição ao sol;
 - Proteção (luvas) para exposição ao sol;

40 dias após exposição ao sol



- Finalização da região escura no contorno da queimadura;
- Pele pouco avermelhada e término da sensibilidade,
 - Protetor solar Sunmax fator 60 durante exposição ao sol;

60 dias após exposição ao sol



- **Pele próxima a cor natural;**

Espero que minha falta de atenção, sirva de exemplo a todos.

Portanto ao manusear limão, nunca se esqueça de lavar muito bem com sabão e água corrente, as partes que tiveram contato com o sumo do limão e principalmente com o ácido da casca.

SP, 02 de Março de 2005